



Chinese Surgery


Vol. 4











外科圖說卷四

華亭　高文晉梅溪氏輯
男　鼎玉味卿氏校

痔漏總論

痔漏一證。方書以肛邊腫核者爲牡痔。有孔者爲牝痔。癢而痛者爲脈痔。有寒熱者爲腸痔。出血者爲血痔。東垣立濕熱風燥四治。以秦艽蒼朮湯治腸頭結之濕爛也。當歸郁李仁湯。理癢而兼痛之風也。涼血湯治大便閉結之燥與火也。丹溪專以補陰涼血爲主。其意甘寒可以息風。滋陰必能除燥也。彙參先哲

似無餘藴但病有兼因法無一定不得不稍加蛇足以完全璧至若氣血留滯者通補可投膏粱藴熱者清疎爲貴有核燥濕兼投痛久須加攻絡成漏者無分虛實年多法用培元黑地黄治脾濕腎燥之要藥天眞丸補眞虧精乏之靈丹補中能升氣陷歸脾善止血流班龍丸功擅温煦奇督逍遥散藥力善調肝强六君培脾胃左歸救腎傷至於濕熱下流致害腸胃者方法詳後宜變通施治可也

二十五類圖註

蓮子痔　狀如蓮子

通腸痔　其根生於臟出糞即下

氣痔　感氣即下

漏痔　氣血衰敗久勞淹臓不曾洗淨

勾腸痔　其形遶腸頭者

蓮花痔　形如蓮花

雞心痔　其形如雞心

垂珠痔　其形垂下如珠

貫瘰痔 穿而貫膿血

菱角痔 形如菱角

子母痔 一大一小

鼠妳痔 形如鼠妳

泊腸痔 緊泊肛門者

栗子痔 其形如栗子

盤腸痔 盤腸而生

翻花痔 形如翻花登廁即出

雙頭痔 有兩頭

血攻痔 即血出

夫妻痔
一圓一長即雌雄也

脫肛痔
肛門脫下痔漏

三迷痔
有三珠財迷色迷酒迷故多之

珊瑚痔
形如珊瑚

擔腸痔
其痔橫在肛門

櫻桃痔
形如櫻桃

雌雄痔
酒色食毒不慎此間黑色

右諸痔名類不同其種則一何也皆由大腸傳道

以成風熱深而腎虛爲冷氣相攻飽食猪雞魚膾燒酒釃酒生酒辛辣等味或登厠臟虛爲風邪所襲六氣七情所感人生素不能飲酒亦患痔者臟虛故也亦有父子相傳者母血父精而成腸風者血痔之漸也速服凉血補劑少勞戒怒遠色忌口斯能愈矣

法製枯藥法

信一兩　白凡二兩爲末　飛丹五錢

硃砂五錢臨時生川巴豆去殼五粒

先將凡一兩半安於瓦盆中隨將信摻在凡上再

將丸覆上火熬枯取出爲末加硃砂末五錢和匀

碾細末如塵先用魚腥草煎湯洗淨每用少許點

上少頃黄水漸出一日夜三四次如無魚腥草或

荼蘼花或野薔薇花紅白槿樹花代之或甘草湯

亦可

今用藥開於後

護肉藥

鬱金五錢　黄連五錢　白芨三錢

右爲末用蜜水調稀先將此藥塗在痔四邊好肉

上却用薄紙貼定固濟了好肉方用痔藥點之

痔漏千金秘方

用牡蠣二兩煆過入地窖坑埋之去火氣爲細末

痔漏瘡若濕乾摻若乾以津調搽痔上

又秘方

砒霜白色明淨者五錢　白礬一兩二錢明淨者

黃丹六錢水飛過二次焙乾　草烏頭二錢爲末骨去皮生用

蝎稍八个瓦上焙乾

右件用舊鐵杓或熟鐵銚先將炭燒鐵銚透紅放

冷揩拭淨將砒打碎如豆大將白礬燒令滚沸將

碎砒投礬內拌勻以文武火煆旋旋攪入草烏蝎

稍黃丹同研末收[illegible]小[illegible]用先將痔漏以
甘草湯或葱湯洗淨將生麻油調藥少許以鵞翎
掃藥在痔漏上日三次第一日第二日瘡內必出
黃水如膠其痔漸消看漏深淺就將薄綿紙裹猪
鬃三根先入在漏內試漏深淺就將藥紙撚之藥
捅入漏內其藥紙撚久不取出如換藥紙撚方取
出再換新藥紙撚入漏內日上三次蚤午晚用藥
俱要洗淨漏用藥三五日痔漏頭併瘡口俱黑色
然後不用紙撚藥其漏瘡根自落如漏不深入內
上用藥點搽如瘡紅活平復不收口方用生肌散

藥敷之立愈其瘡根永不再發矣

生肌長肉藥

血竭五錢　龍骨五錢　光粉二兩　白芷五錢

黃丹三錢水飛炒　軟石膏一錢　黃連五錢　海螵蛸一錢

黃栢一兩　五倍子一兩

右爲細末如瘡孔深用蘆管吹入裏面如瘡口淺止乾掺入內生肌平復不用

點痔藥

氷片　乳香　沒藥　龍膽

俱爲末用蝸牛一枚碎其底入前四末放盞內化

如未以銀簪滴汁痔上甚効　田螺代之亦可

痔漏藥

用銅杓內制牛黃末一分先炒微煙即下礶末二錢候煙起再下白礬末九錢待滾乾取起仍入火微炒煆安地上出火毒爲末後入乳香辰砂沒藥氷片各一錢共爲極細末每用一錢許以稠糊調和隨漏孔大條子量深淺長短用之如瘡孔爛大止用津唾調之塡入孔內待痔已潰動毒水自流如好肉生瘡即以五黃膏護外如入錠時仍用唾調前藥末付在痔根上如痔根脫落摻生肌散并

多服蠟礬丸

生肌散

龍骨煅　海螵蛸　赤石脂各錢　乳香

沒藥　血竭　輕粉　雄黃各五分

末出毛小鼠二枚炙乾

各爲末如塵臨用加氷片少許

又生肌散

寒水石煅一錢　龍骨煅五分　乾胭脂三分　輕粉

爲細末乾摻新瘡加薄荷一分老瘡依此

辰砂錠子　久痔成漏

信一錢　白凡二錢　蜜陀僧五分　辰砂五分

先研信細入磁盆中次用凡銀信上煙盡爲度再將蜜陀僧辰砂研細白麵一些和作尖錠子頭漏納瘡口腐去敗肉方可生肌

盤腸通腸痔散

痔在內用此敷之痔頭頂自出以前藥搽之

磁石一錢　枯凡五分　白乾薑五分　草烏尖三枚

右爲末葱汁調敷

痔腫者

用殼木鱉五倍爲末蜜水調敷

諸痔

用螻蛄五枚搗碎水銀一錢射香三厘氷片五厘

用銀簪蘸汁滴患上

痔漏

用團魚一枚扯出頭殺之取血即將團魚頭燒灰

爲末血爲丸如棗核大諒痔之大小爲之入內

漏孔不合

用石楠葉煎湯放在桶內薰洗待湯過手就將漏

洗淨後將黃牛面前牙齒四枚裝在小瓶內用炭

府燃之待白煙出爲度取出研末用津液蘸焦牙末

點入漏孔中[illegible]黃芩二寸鹽苗 預製備

益氣淸臟湯

人參　當歸　條芩涼大腸　黃連

生地　赤芍藥　梘角　川芎

升麻　枳殼寬大腸　秦艽　白朮

茯苓　甘草

水二鍾薑一片燈心廿根煎服

秦艽蒼朮湯

秦艽一錢三分　當歸一錢　澤瀉　防風各三分

蒼术五分　桃仁一錢研為泥　檳榔末五分

大黄一錢雖大便燥亦不宜多　皂莢燒存性去皮一錢

黄栢五分若大腸頭沉重者濕勝也更加之天氣大熱或燥熱喜冷者以意加之

右用桃仁檳皂三末另外餘作一服水煎去查加三味末調匀再上火煎一二沸空心服之再食美膳壓之不犯胃氣忌生冷硬物桃李梅杏菓品油麪大料生薑胡椒之類第二服如前加木香末三分

秦艽防風湯

痔漏每日大便時發疼痛如不疼痛非痔漏也

秦艽　歸身　防風　白朮各一錢半

黄栢五分　陳皮　大黄煨各三分　粉草

澤瀉各六分　紅花一錢　桃仁三十枚

右作一服水煎空心服

秦艽羌活湯

痔漏成塊下垂疙瘩不任其痒惟雞心垂珠栗子

雙頭子母夫妻櫻桃下垂等痔

秦艽　黄芪各一錢　升麻　大柴胡

甘草　麻黄各五分　羌活一錢二分　細辛

藁本　紅花各三分　防風七分

秦艽當歸湯 痔漏大便結燥疼痛

秦艽 枳殼 當歸各一錢 桃仁廿枚去皮研

紅花三分 大黃煨四錢 澤瀉 白朮

皂角仁各五分 白水煎

當歸郁李仁湯

痔漏大便硬弩大腸下垂多血苦痛不住

皂莢子另末 郁李仁 麻子仁各一分 秦艽一錢五分

蒼朮 當歸 生地各五分 枳實七分

澤瀉 大黃煨各三分

水二鍾煎成加皂莢子末切不可在風寒處

紅花桃仁湯

痔漏如勾腸蓮花菱角翻花珊瑚盤腸等痔年久不愈治法當補北方瀉中央

生地　當歸　紅花　防風

猪苓各五分　蒼朮六分　澤瀉八分　麻黄二分

黄栢一錢五分　木香二分　白朮煎

槐角子湯

外痔併漏根帶落下然後服此藥除腹内之毒

槐角子　枳殼　黄芪　黄連各五錢

薄荷二錢

右㕮咀作二服水二鍾煎至八分空心服

木香散　用藥後小便不通服此藥外痔不用

山梔子　木通　車前子各三錢　淡竹葉

生地黄　黄芩五錢　燈心三十根

右㕮咀每服四錢水一鍾半煎七分空心服

又方

痔貼藥之後惡毒未盡將粳米一兩炒黄色用水

一鍾煎至七分加酒半鍾溫服之痔永不發矣

飲酒食熱物脾主太熱而助三焦氣盛火生土也

當瀉三焦若火熱退金得氣而反制木若木受制

則五蟲不生矣

蒼朮四兩去皮　地榆　皂莢子各一兩燒存性

澤瀉　枳實　秦艽各二兩

末之搗飯丸每服五十丸溫酒米飲任下一方去

蒼朮加白朮

秦艽白朮丸

痔漏有膿血大便結燥腫硬疼痛

歸尾　枳實　澤瀉　白朮各五錢

秦艽　桃仁製　皂角仁燒存性各一兩　地榆三兩

末之和桃仁泥煉蜜丸每百丸鹽湯下乾物壓之

槐角丸

槐角去梗爲末入烏牛膽内掛透風處爲末煉蜜

丸每服四十丸平胃散作湯下

腸風痔漏下血臟毒

大黃煨　桃仁各三分　當歸　檳榔

皂角仁　黃栢　荆芥　枳殼各五錢

蝟皮炙　黃連　秦艽　槐角各一兩

末之麪糊丸每五十丸食前白湯下鮮血下者加

大腸內結燥疼痛

秦艽　枳殼緊小者各一兩　桃仁四錢　皂角仁七錢

紅花三分　澤瀉　白朮　黃栢

黃連　防風　當歸各五錢　大黃四錢

末之麵糊丸每六十丸白湯下

黃蠟丸

黃蠟四兩丸如桐子大月朔服一丸次日服二丸

三日服三丸漸加至月盡三十丸已後每日減一

丸至一丸止用酒送下輪流服之其瘡自痊一則

不必服矣

潤腸丸

當歸五錢 枳殼五錢 百草霜一兩五錢 大黄五錢紙包煨

右爲細末糊丸桐子大每服三十丸白湯下

已破未破痔漏方

當歸酒浸二宿晒乾火焙 槐角子麩皮炒 蝟皮炒黄

地骨皮淨晒乾

右爲末各等分每服三錢五分空心溫米湯調五更服之後畧睡一二刻少進米粥但宜乾餅一塊少言語自早坐至午怡情適性方愈

一方

用青荷葉燒灰爲末空心酒下三錢

又方

用金銀藤并花爲末每日酒下三錢

療痔神方

橡子粉　糯米粉各二升爲末炒黄

每用二合滚湯調成餅飯上蒸熟空心食之

壯氣收腸方

木鱉花內痔痔頭落腸不收服此藥外痔不用

黄芪二兩　白芷二兩　防風二兩　厚朴三兩

當歸各二兩　川芎一兩　蔓荆子一兩　桔梗一兩
木香一兩　人參三錢　肉桂五錢
右爲細末每服三錢空心棗子湯調下日進三服
力壯其腸自收矣

猪肚膏
用雄猪肚一枚去垢淨入皂角刺二一兩縛定兩頭
煮爛去藥空心任意喫又不可用鹽醬服三肚後
即除根

一人患痔每日食海螺螄半斤因鹹以苦茶漱口
約及二斗又能清心寡慾痔可消矣痔乃臟火屬

陽海螄乃性寒味鹹屬陰寒能散火鹹能軟堅者

又苦涼之味要又論之殆有[illegible]也

小兒生痔空心服甘草膏白[illegible]也

孫眞人射香膏

射香二分　乳香三分　血竭四分

右爲一處以小紅棗煮去皮核肉和藥作餅依痔大小放痔上用膏藥貼之痔內血水黃膠水流出此痔患之毒也一二次即愈

丹溪先生治漏瘡先用補藥以生氣血參芪歸朮爲主大劑服之乃王道平平之劑外以附子末津

液作餅如錢厚放漏處艾灸之令微熱不可令痛餅乾再易之其餅隨症大小爲之如困倦止之明日再灸以肉平爲度仍前服補藥摻生肌長肉藥

薫痔方

用大雄雞宰去血在湯鍋內撏去毛取出雞將此撏毛垢湯燒一二沸傾在淨桶內蓋定其氣少頃將陽物放桶上坐緊薫之候湯溫洗痔淨拭乾隨將蜈蚣一條碾末艾二錢和捻成條放馬桶內坐薫之其痔焦熱尤妙新生者一兩次得愈久生者五次得愈備加蜈蚣并艾薫後隨服益氣清臟湯

秦艽蒼术湯調治之

洗痔方

馬藺頭一斤皮硝四兩煎滾坐薰候湯溫洗之

又方

牛膝搗爛煎湯洗之　紅花子打碎煎湯洗之

又方

魚腥草煎湯洗之　白地棯煎湯洗之

洗痔國老湯

荆芥一兩　甘草一兩　藿香五錢

右不拘多少煎湯溫洗洗一次用藥一次用藥之

後如大便閉塞用此外痔不用

又方

皮硝　鳳尾草　五倍子　韭菜子等分

水一桶煎數沸放桶內坐之薰洗

脫肛痔

肺與大腸相爲表裏故肺臟蘊熱則肛閉結肺臟虛寒則肛脫出此至當之論又有婦人產育過多力盡血枯氣虛下陷及小兒久痢皆能使肛門突出治之惟溫補肺臟滋榮腸胃久則能自收矣

血虛脫肛以四物湯爲主氣虛脫肛以參芪歸术

爲主血熱以涼血爲主四物湯加黃栢

摻藥

乳香五分　沒藥三分　血竭一錢　紅絨灰五分

牛黃五分　冰片二分　珍珠三分　孩兒茶二分

象皮灰三分　昇藥三分　五倍二分

右爲極細末用後藥湯洗淨乾摻　須要避風

大人小兒摻藥

赤石脂　伏龍肝各一兩

爲末付腸頭上日三次

開元大補湯

人參三錢 升麻五錢 白术二錢土炒 白芍藥一錢酒炒

生地一錢姜汁煮 歸頭二錢 黃芪三錢

黃栢 知母各一錢俱鹽酒製 粉草五分炙

山藥一錢 防風一錢 肉桂五分 附子七分

紅花六分

右作一服水二鍾姜五片棗肉二枚煎服川芎不用因泄氣故止之 虛甚倍加參芪歸麻

虛人脫肛補中益氣湯加黃栢知母蒼术黃芩肛門痒加秦艽桃仁大便閉塞加皂角仁

冬至前天道嚴寒其氣極沉極降之際況人身小天地天在上人居中地在下豈不相應乎治之不能即奏功也陽生後日長一線陽漸長陰漸消矣宜用灸法治之無不效者病人亦要戒氣少勞驚上策擇晴明和暖吉日在不通風淨煖室中坐卧取頂上旋毛中百會穴以醬一七搽上艾灸三壯隨服升元大補湯其肛漸收矣蓋百會爲一身之樞紐大能升提下陷之氣故能奏功若冬至前不可灸灸之何益次日再灸尾翠骨又灸臍中隨年壯此法余用之甚效　諸痔漏亦治之

洗法

用生鐵五斤水二斗煎至五升出鐵洗之日三次

明日再易新鐵如前洗之

又方

枳殼　朴硝　川芎　當歸

桑枝　艾葉各一兩　地榆　蒼朮

右煎湯洗之　但肛門收上十有一二須服補

劑調攝之其餘者漸漸乾息結痂偶遇喜樂之事

忽然脫落一黑圈噫此腸有餘乃截腸也

鼻痔　一名息肉

鼻居面中爲一身之血運而鼻孔爲肺之竅其氣上通於腦下行於肺若肺氣清氣血流通百病不生肺氣一有凝滯諸病生焉鼻孔中息肉名曰鼻痔皆由六氣七情所感而成若生上入眼名曰弩肉若生下入鼻中名曰息肉窒塞不通戒酒絕慾除煩惱戒憂愁內服煎劑外用點藥庶平復矣

通氣辛荑散

藁本　羌活　防風　薄荷　白芍　辛荑

升麻　甘草　川芎　當歸　生地　黃芩

連翹　桔梗　白芷　黃連　麥冬　柴胡

水二鍾姜一片煎服

消痔散

蜜陀僧一錢 信一錢五分 白礬一錢

煅法陀僧礬四邊信居其中放在新瓦上煅煙盡爲度入地下一夜出火毒取出加射香二分爲末吹入鼻孔内時用手指揉鼻上下三百度其藥味漸入痔易化水矣外用搜濕麵糊塞鼻孔使藥味上行一日三四次點之其藥磁礶收貯

又方

仰臥時用白蔔汁滴入鼻孔中即消

又方

雞內金炙研末細如塵五錢　射香三分　鴨嘴膽礬二錢

銅綠二錢　枯礬一錢

右各研極細和勻磁確收貯以蠟固口勿令出氣

臨用時點鼻中如前法夜間多點之其息肉十日

之內漸漸脫落或點藥揉鼻後出水不須憂慮此

息肉所化也如不能盡脫用鑷子徐徐擺動取出

亦可恐落後其根不能盡去再點藥四五日以絕

其根凡點藥務揉之

附鼻不聞香臭通氣湯

羌活　獨活　蒼朮　防風　薄荷

荆芥　升麻　乾葛各一錢　甘草五分　川椒

白芷三分　冬天加麻黄一錢

水二鍾姜三片棗二枚葱白三寸煎

附酒皶鼻

四五年久藏糟茄露調硫黄末塗之四日後即消

連翹仁細茶各半為末臨睡茶清送下三錢

附鼻衄　山梔燒灰為末吹鼻內　或田螺氷滴入

鼻內

耳鼻出血方

射香一分 沉香三分 白凡一錢 糯米五十粒

各爲細末麵糊丸如荳大絲綿包之如鼻中出血塞於兩耳耳中出血塞於兩鼻如左耳出血塞右鼻孔如右耳出血塞左鼻孔如左鼻孔出血塞右耳孔如右鼻孔出血塞左耳孔即愈

煎藥二神湯耳鼻皆可服

生地一兩 麥冬一兩 水煎服之



鶴膝風痢風鼓槌風風之類也氣血相並而行遇于一身得寒則行遲而不及得熱則行速而太過內

傷七情外傷六淫則血氣之運或遲或速而病作矣多因日久得熱已自騰沸後復感冒濕熱血受邪鬱為瘀滯不得運行所以作痛夜則痛甚行于陰也治以辛溫監以辛凉流散寒濕而積熱得發其血自行與氣相和其病乃止或因峻藥取効性急作勞常享厚味感冒風雨腿腫則痛甚皆瘀血流于經隧行久不治恐成偏枯以致膝腫筋縮大痛兩足無力脚弱漸細髀脛枯槁拘攣不能屈伸治宜祛風順氣補血壯筋養陰除濕則氣血通暢自然愈矣

大防風湯

人參一錢五分　羗活　獨活　甘草　牛膝各一錢

白芍　熟地　白术　防風三錢　黄芪

杜仲　川芎各二錢　蒼术一錢五分　附子二錢

水二鍾姜五片棗肉二枚煎服飲好酒以助藥力

追風除濕圓藥

多年陳小粉四兩炒焦色　乾姜一兩　官桂一兩　五倍一兩

白芷一兩　龜板醋炙一兩　當歸一兩　防風一兩　白芨三兩

烏藥一兩　乳香一兩

右爲細末用老姜汁釅醋各半葱汁一分蜜少許

火上熬熱調藥乘通手搽四向空中出毒時用餘汁熱潤之以助藥力

四妙丸

蒼术二兩　白芍　龜板好酒炙酥各二兩五錢　黃柏五錢鹽酒拌炒

右為細末酒糊丸如桐子大每服六七十丸當歸湯下酒亦可嚴寒加附子二錢

膝眼毒

此毒受在腎經膀胱不流氣血凝滯而濕熱攻于膝眼結成毒也圖藥用鶴膝風藥敷之煎劑用木香流氣飲　當歸　蒼术　白芍

白朮　白芷　川芎　木香
牛膝　木瓜　烏藥　澤瀉
薄桂　紅花　五加皮　茯苓
葳靈仙　水二鍾姜七片葱白二根煎服
次服大防風湯　方在前
又方治膝腫
歸須　赤芍　桃仁
蒼朮各一錢　黃芩　連翹　羌活各五分　木通
紅花　甘草生各三分　黃柏七分　金銀藤二錢
一人痰濕流注膀膝紅腫如腫毒相似脉浮滑用前
藥十二味加南星牛膝龍膽草

人面瘡

此症生于兩膝之上形如人面口眼俱全患人飽則不動飢則口眼俱動俗呼爲冤業瘡膝蓋之間

然膝者筋之府屈伸不能而行則僂附筋將憊矣此係皮肉堅硬之所且生疽毒則裏先潰後爛皮膚攻作故成此形宜作善事解之須要眞誠懺悔然後方可用藥初用流氣飲久不愈者服苦參丸補腎水再用猪蹄藥湯洗之以生肌定痛散摻之後用膏藥貼上

流氣飲　苦參丸　方具癧疽圖後

又方摻藥　貝母末用竹筒吹入瘡口內數日成痂而愈

肫疽

骨槽疽

肫疽腫高而硬俗言此疽堅硬無膿殊不知其因成膿在內一時不能出皮膚須用內托發出方可用針刺破骨槽疽生于膝蓋上并脚趺上腕其痛時如刀割其痒似蟲鑽急用艾灸疽上三五壯便貼乳香萬應膏更服黃凡九

治法同附骨疽

脚手發背

此症因心經有熱行履高低傷于足趺血聚成疽

治法同冷漏濕毒流注

加味流氣飲 治足上

川芎　麻黃　甘草

肉桂　乾姜　半夏　茯苓　枳殼

白芷　厚朴　芍藥　陳皮　蒼术

姜三片水煎服

木瓜檳榔散 治足上

檳榔　木瓜　紫蘇

陳皮　甘草　木香　當歸　赤芍

再服蠟凡丸

羗活散 治手上

羗活　獨活　前胡

荆芥　甘草　烏藥　桔梗　薄桂

升麻　當歸　葳靈仙

骨瘦疸

此疰生于手陽明之間初如粟漸長如赤豆其痛不可忍漸長大如楊梅之狀血不出亦不生膿毒從經絡流于遍身有此疾者宜當謹防不可視爲輕疾昔日山東唐世民感此醫者云此疽生爲奇相恐是惡毒世民笑而言曰吾乃識字人天賜與吾爲筆架後及一月遍身攻串其疽只口内出臭黃血水三五碗出水不至十日其亡矣後待洗浴停屍衆人持起遍體俱爛皮肉盡落今有此疾各宜仔細推情施治之宜用治疔之法加減行之

圖論　方

手心毒與手背毒同治



此毒右手受在陰火太陽陽明氣血流於左足厥陰經左手毒在心火太陽流於右足太陰陽明土復生流于五行子母更相生養或因喜怒憂思寒

凝氣血阻滯不通結聚成毒當用定痛解毒之劑

紫蘇　芍藥　甘草　桔梗　枳殼

烏藥　白芷　防風　羗活　獨活

川芎　茯苓　黄芩　薄桂　乳香

威靈仙　右水姜三片煎服

后用內托流氣飲

當歸　人參　木香　乳香

川芎　黄芪　芍藥　防風

甘草　厚朴　枳殼　桔梗　烏藥

白芷　檳榔　紫蘇

姜三片棗一枚煎服外用金箍散敷之

手腕毒

此毒受在掌后因心經風寒喜怒驚風痰盛血不

流通結成此毒當用定痛敗毒散內托清氣飲或透手心或透腕外再用三香內托散治之

定痛敗毒散

白芍　白芷　乳香末　桔梗　枳殼　防風　當歸　羌活　茯苓　甘草　薄桂　靈仙　木通　金銀花　姜三棗一煎服　夏天加黃芩

內托清氣飲

人參　黃芪　紫蘇　桔梗　金銀花　枳殼　青皮　甘草　厚朴　川芎　防風　天花粉　木香　羌活　當歸　芍藥　煎同前



此毒生于左肋下三指初起如痞日漸長大如椀即時就成水遶皮週圍攻結成膿形如蠱脹肚無青筋而臍不凸只是壅脹便服二十四味流氣飲

猪苓　茯苓　藿香　砂仁　桔梗
枳實　厚朴　澤瀉　陳皮　紫蘇
當歸　青皮　香附　枳殼　赤茯
檳榔　木瓜　川芎　赤芍　黃芪
甘草　肉桂　木香　肉蔻
水煎空心服只可一服不可再服　然後用
內托散　桔梗　厚朴　白芷　防風
人參　黃芪　香附　陳皮　川芎
甘草　官桂　當歸　赤芍　金銀花
或加木香　行藥用腸癰方

螻蛄三串

螻蛄三串上下三種因受濕毒傷于膚氣血傷于
腎怒氣傷心而瘀血滯氣相搏故成此串毒也用

流氣飲

紫蘇　桔梗　枳殻　烏藥　甘草

芍藥　白芷　川芎　防風　厚朴

木瓜　香附　官桂　川楝子

水二鍾姜三片棗一枚不拘時服

二香内托散

人參　黄芪　當歸　川芎　芍藥

甘草　乳香　烏藥　防風　官桂

厚朴　桔梗

姜三片棗一枚水煎溫服

又方

紫蘇　枳殼　桔梗　甘草　赤芍

防風　當歸　川芎　羌活　厚朴

茯苓　前胡　生地　白芷

姜三片棗一枚不拘時服

熱加　柴胡　陳皮　半夏

定痛降氣飲

芎藭　白芷　細辛各一兩　殭蚕五錢生用

右爲細末煉蜜丸每服一丸清茶嚼化

治法同三串及諸癰疽


發聵

蓋膊乃少陽經多氣少血厥陰匠少陽有相火兇甚于厥陰皆由多慮勞神六氣七情相感預宜防肌肉難長暴戾之藥勿輕用之

一人右膊外側生一結核身微寒熱易怒平居奉養甚厚診其脉俱浮大弦數重按似濇皆因憂慮傷血時在初秋切勿輕視宜急補以防變症宜人參一觔作膏和淡竹瀝服之方保無虞奈病家吝費求他醫治之以十宣五香相間服之旬日后忽大風拔木病者發熱神思不佳其核卽稍高大似有膿狀外腫起紅線延至肩後遶背脊入左脇下不

痛肩背重急食欲嘔急服人參膏入川芎生姜汁

服盡三觔而安然瘡潰膿乾又以四物湯加人參

白术陳皮炙草生姜水煎服數劑而安此病生于

春令甚難療者幸生在秋不幸暴風大作激起相

中相火非人參川芎膏驟補何由得生也

人參四兩 川芎一兩 生姜五錢

右剉片水四碗煎至一碗去查重湯熬膏每次如

之臨服加竹瀝

但此症之發紅腫或如粟多以小而忽之



遊丹者即遍身丹毒也初發兩手青腫徹上下急
急痛若經一宿二宿腫氣遍身入心內腫即死初
覺急治之宜服五香連翹湯木香流氣飲以金箍
散敷之宜用治疔之法治之



火赤瘡者氣血虛羸邪毒攻發初生赤色燎漿走

徹成膿生疱黃水時出沾破皮膚或如火燒疼痛須用清肌解毒消邪熱降肺火補腎水之劑治之

犀角　甘草　乾葛　山梔　黃連

黃芩夏天倍加　白术　牯子　歸須　川芎

赤芍　黃柏　知母　荆芥　薄荷

青皮　桔梗　蟬脫　石菖蒲　天花粉

清凉膏　黃連黃芩山梔薄荷甘草桔梗枳殼煎數沸去查加氷片射香各三分鵝毛掃上指日得愈

紫金錠水磨塗之

發背



發背之生積毒臟腑正氣盛掩留停緩元氣虛朝輕夕重如發弓矢外小內大內托則生敗毒則斃治法以參芪爲主一定之論百世不易凡癰發于背廣一尺深可一寸雖潰至骨不穿膜不死此症六氣七情或因飲食而感其毒積于脾肚之間用藥先消脾肚中之毒內外夾攻斯無患矣

發背癰疽惡毒

人參　黃芪　當歸　白朮各五　橘紅一錢五分

右剉水煎入竹瀝姜汁和勻服之如欲煎膏加參芪等藥各四兩

腫瘍加當歸連翹羌活　潰瘍加芍藥川芎甘草
白芷　酒毒加酒炒黃連
氣加炒香附　痰加瓜蔞仁
發熱加酒炒黃芩　渴加麥冬天花粉
惡心加半夏生姜藿香　解毒加金銀花甘草節
瀉加蒼朮白朮俱土拌炒
在太陽上加羌活　在少陽上加柴胡
在陽明經上加鼠粘子白芷升麻

魚脊瘡

魚脊瘡者臟中積冷腎氣虛寒故虛熱得傳經絡筋骨之間發動不知何處初生如疽癰破時黃水

流生白泡似魚脊若不速治肉爛膿流命亦難保

先服神功活命湯次用歸芪調榮湯或參芪內托散

當歸　川芎　生地　白芍　連翹

黃柏　知母　茯苓　甘草　升麻

白朮　桔梗　黃芩　獨活　青皮

白芷　苦參　天花粉

體虛加參朮減苦參連翹

外用解毒潤肌散搽之或用金絲膏貼之

洗用猪蹄煎湯　或用地骨皮煎湯尤妙

散走流注發

大凡氣血不調經絡不通復感六氣七情故毒氣乘風熱而走是也此症因風盛而生熱之症熱極氣盛氣因熱之極而走於四散急宜疎風定熱則氣自然而息若元氣盛初發者速以艾灸七壯四圍敷藥內服二十四味流氣飲無不愈者若流注于手脚腿者死無疑矣

妙貼散

白芷五錢　南星五錢　肉桂五錢　蛤粉五錢　五倍一兩

芍藥七錢　多年小粉八兩炒焦　白芨四兩

右磨末每用生姜自然汁好醋葱蜜搗汁和匀火

上熬熱調藥如糊敷四向空中出毒乾再用前汁

潤之以助藥力

加减二十四味流氣飲

陳皮　半夏　升麻　乾葛　甘草

澤瀉　茯苓　蒼朮　厚朴　木香

羌活　獨活　防風　荆芥　薄荷

黄芩　川芎　當歸　生地　白芍

黄芪　青皮　木通　白芷

冬天加紫蘇大柴胡水二鍾姜五片葱白三根煎

熱服以衣覆患上出汗爲妙止可一服

參芪內托十宣散

人參一錢五分 黃芪二錢 陳皮八分 甘草三分 升麻一錢

茯苓一錢 白术 澤瀉二錢 當歸二錢 川芎

生地 白芍 黃芩 天花粉 烏藥

前胡 黃柏 知母

冬天加桂 倘有餘內症因症加減全在活法施

治

背發兩頭



此症兩頭小者四邊散攻乃因飲酒體虛之所致
也而氣食相鬪合陰虛而成之氣虛而散所以開
口而潤急服內消藥亦宜補陽也治法與發背肩
癰同前方加減服之

腎俞發

腎俞之發屬陰人難知識因受暑濕并怒氣飲熱
酒而得之傷於內腎之間流毒在腎急用解內腎
之毒內外攻之若腎經傷膜者難生矣切戒怒氣
行房稍或一犯决不可治
治法同發背癰疽而補腎加黃柏知母沒藥廣膠

對心發此症難治

心者君主之官神明出焉恬澹虛無病安從來心

有怫鬱諸病生焉發于手足者皆由于心火故發

于心乎此症乃對心發因心火盛而熱氣會生于

此處其毒愈盛急用疎導心火之藥解之用意調

處若合兵法方有生機必須戒性若一怒不能生

矣發于心之側者亦可治

黃連解毒湯

黃連姜汁拌炒　甘草　升麻

桔梗　茯苓　黃芩酒炒　山梔　當歸

川芎　白芍　生地　枳殼　玄參

天花粉　連翹　小柴胡　金銀花　燈心

臨服加犀角汁服四劑后宜加人參　護心散

蠟凡丸日夜服之


連珠發

此疾若陰囊赤腫小便不通小腹脹痛此疽因色
慾過度及醉飽房事以傷腎水得此疾者必致成
串令人口乾身發寒熱百節皆疼治方于後
十奇散　治發背傷于腎者
桔梗　人參　歸身　天花粉　五味子
芍藥　烏藥　香附　枳殼　木香
囊腫加　川楝子　檳榔
百節疼痛加木瓜　牛膝　赤芍
寒熱加　柴胡　黄芩
酒煎散　治發背因毒內攻其毒與好肉一般平者

用手按之如牛頸之皮上有黃泡出腥水乃毒入于肺若不速治即死

當歸　穿山甲炮　白芷　升麻　肉桂
木香　川芎　赤芍　甘草　酒煎服

或患處好肉四邊紅腫其色如火用磁鋒砭去惡血即用鷄子清調乳香末敷之時時用芭蕉根汁潤之以助藥功


蜂窠發

此疾若肉黑色青色中大陷四圍硬肉亦紫色風毒氣傷于腠理可發出即生不發出即死此毒因膏粱之味濕床厚被醉飽房事以致五臟積毒不流積而爲癰則心神恍惚夜夢不安小便頻數大便溏泄此疾串于左脇即死治方于後

內托十宣散

人參　黃芪　白术　當歸　白芍

厚朴　白芷　川芎　連翹　官桂

桔梗　防風　甘草　荆芥　金銀花

水二鍾煎八分食前連進十貼

虛甚者加附子

心神恍惚夜夢不安加遠志辰砂酸棗仁

大便溏泄加黄連木香白术土炒蒼术

内陷不發加穿山甲乳羊角燒灰

小便頻數加薏苡仁益志

膿不透加歸須地蜈蚣炙赤芍藥

連服蠟凡九日進五服

膿將透便服排膿内補十宣散即内托散

加木香穿山甲　仍貼金絲膏


經體發
氣針
取膿針

此毒因暑熱之時空心受其穢氣以致胃氣仍然

則致嘔逆如若不治毒氣入內則難生矣急服乳

香托裏散再服五香連翹散蠟凡丸外貼金絲膏

內服忍冬酒一口　三服　忍冬酒方具前

連子發背

上中下三搭手受在五藏六府毒熱憂怒氣壅傷手肺經結聚成毒此是悪症也當用腦疽發背癰疽等藥治之

圍藥亦然　時進忍冬酒蠟凡

上中下三發背

此疽發于右胛中恐其毒氣奔入心大要用藥散之付圍藥點截住不令攻心如在中道通于背皆腫不可救也消者可療諸瘡癰痒皆屬于心以心生血而行氣之痛諸瘡皆有敷藥就上下打大針三四針為妙用前化毒消腫散于金內托散多加參芪

圍藥　南星　草烏　木鱉　貝母

大蒜另搗　白芨　五倍已上為末　生姜取汁　米醋

調付留戶二三日夜即消盡矣常以醋潤之

護心散蠟凡丸時刻不可缺

上中下三搭手

上發背受在胸道經主傷于肺肝心經驚鬱結聚怒氣傷肝壅出背毒此乃惡毒症也先用敗毒流氣飲次用護心托裏散后用內托流氣飲治之敗毒流氣方在後又并護心托裏散流方于後

中發背受在神堂靈道經正心毒心血湧出不能歸肝氣血壅在背中損于肝經此乃惡症當用煎藥治之敗毒流氣飲方在後


下發背受在脾肝經絡凝滯于五臟傷于三經此是三毒之症也先用敗毒流氣飲後用人參內托散外用圍藥敷之

對臍毒 名衝疽

衝疽者生于腰腎也發背骨作瘡腫又名對臍又
名歷腎主心流入腎囊三十日可刺其膿赤白色
者不死青黃紫色又兼謊語及見物者瘡發則肉
腎疼變爲渇者萬無一全也多服參芪內托散
加知母　黃柏　麥冬　以滋腎水

腰疽

此疽受在陰包氣穴傷于濕氣血不行流注經絡
此是毒症也當用發背藥治之三五日內宜灸七
壯即消


痰注如纏袋形

所謂痰注者何來六氣七情所感痰不能流行結于一處伏于經絡之間而背為明堂月深日久結成囊窠內連于臟腑外隔于皮毛宜早治之其形或圓或歪或如米袋堅硬如石外用圍藥次服人參內托散四五十劑元氣充足方可下行劑大便痰積數升而愈

萬應黑虎膏

多年小粉八兩炒黑　五倍四兩炒黃　蛤粉四兩　白芷二兩
天花粉二兩　乾姜四兩　龜板二兩醋炙　白芨五兩　南星四兩
昆布二兩　白芥子二兩　肉桂三兩　烏藥二兩

右各爲細末和勻用生姜自然汁一碗好醋一碗
葱半觔搗爛加蜜三兩再搗取汁半碗三味和勻
火上熬熱調藥俟通手敷患上留一小洞出氣時
用熱餘汁潤之一日夜方可易之敷至一月方得
軟矣亦可下行劑

人參內托散

人參二錢　白朮二錢　陳皮一錢

半夏五分一錢　芥子一錢　黃芪一錢　茯苓一錢

當歸五分一錢　川芎一錢　白芍一錢　黃芩酒炒一錢

蒼朮一錢　香附五分　麥冬五分　枳實五分一錢

黃連五分　桔梗一錢　青皮八分　烏藥一錢

天花粉一錢五分　防風七分　甘草四分　升麻一錢

厚朴一錢姜汁拌炒　加減存乎人

右作一劑姜五片砂仁末五分煎熟臨服加淡竹瀝

姜汁半酒杯和服之服至百劑方愈

神仙救命丹　待硬處活動如綿煎劑服大半方可

下之否則無益有損

珍珠一錢　射香一錢　氷片三分　膽星末五錢

甘草末一錢　枳實一錢　蟾酥六分　巴豆霜五分

全蝎末一錢　蛤粉一錢

右各爲細末和勻米粉糊爲丸如桐子大每服三

錢空心或酒或蜜湯送下其痰從大便中出盡爲
度如不行再服卽行以薄粥補之若不待其軟遂
下行藥命亦難生病者須要揖聽醫師之戒淸心
寡慾戒惱免憂并忌油膩生冷蒜茄等物如瀉不
止另又一方
甘草七分　黃連一錢五分　蒼术炒二錢　白术土炒二錢
豬苓　澤瀉一錢　車前子　炒芍
炒苓　茯苓一錢五分　人參　蓮肉
右水二鍾姜三棗二煎服卽愈
又方　早辰頭一吊井華水冷飲一酒杯其瀉立止


暑疔

大抵疔瘡有十三種而有青黃赤白黑所以應五
臟也復有暑疔火疔氣疔冷疔者皆以其時候緩
急浮實之異但初發起或先后痛先寒后熱四肢
拘急沉重强痛者得症便發寒熱瘡邊麻漸至半
身大痛應心嘔逆自利足冷至膝四畔紫黑色皆
為重症惟麻子始末皆痒若症候寒熱與諸疔瘡
同俱覺背強其痛甚者乃觸犯所致即取枸杞根
擣汁服之彌佳再狗屎白色者得雨露之功臭氣
已去加枸杞根和勻絞取清汁服之尤良但有卒
思喉痛心寒熱或腹痛惡寒發熱者當預防生此

疔症也凡疔瘡多生口邊頬內或舌上赤黑點點
如珠慘痛應心者是也不即治之日夜根長流入
諸脉如箭入身不得動揺經久五六日后甚者毒
氣入腹眼中見火神昏煩悶嘔吐恍惚如醉如痴
不可療矣疔瘡有頭黑硬而凹者瘡頭白而腫實
者瘡頭如豆埀色者瘡頭鮮紅色者瘡頭內有黑
脉者瘡頭紅赤而浮虛者瘡頭如梔而黃者瘡頭
如金箔者瘡頭如茱萸者瘡頭如石榴子者有初
如風疹粉刺搔破入風則出黃水出其裏有赤黑
脉而微腫者肉中突起如魚眼赤黑慘痛徹骨者

結久皆爲爛瘡瘡下深孔如大針穿物初生時突
起疔痂故名疔瘡令人惡寒發熱四肢強直而牵
痛一二日瘡便變色焦黑腫大光起根硬不可近
犯之則痛甚則發于頭面手足骨節間者氣血之
所聚會宜急治之有似灸瘡四邊泡漿者但疔瘡
熟時膿水出瘡孔如蜂窠病易瘥也疔瘡惡症眼
黃面青舌黑冷汗發渴脚冷至膝下不食自利瘡
冷不痛嘔逆瘡不起發四畔不紅瘡邊麻木乾黑
生刺瘡邊紫黑色慘痛應心眼中見火神昏煩悶
神思恍惚猶如醉痴者皆難治也試以針刺患人

手足中指不痛者難治疔瘡初生時紅軟溫和忽然頂陷黑謂之癀走此症危矣急服飛龍奪命丹追疔奪命湯其疔發于太陽脈邊者名曰釘腦疔十死一生內經以白疔發于右鼻赤疔發于舌根黃疔發于口唇黑疔發于耳前青疔發于目下蓋取五色以應五臟各有所屬部位而已然或肩或腰或足發無定處如在頭面手足骨節間者甚急

拔疔要法

妙法傳于後世　求學貴乎心求

不可妄治以傷生　不可過時而難療

凡疔瘡之起多發于嘴唇上邊初如米大或粉刺擠破入湯火風氣亦要變成疵瘡疵瘡者即疔之別名也先用葱白同飛龍奪命丹五粒和嚼爛熱酒半碗過下以衣覆患上署出汗為妙上午服藥下午即將絕利磁鋒劃破瘡口十字即摻飛龍奪命末在內而外用蟾舌研爛蟾肚底皮貼之內服追疔湯劑若發于鬚髮者即剃去鬚髮如前法治之此法靜夜細思試而行之百發百中活人多矣焉敢自秘遂并梓行病人一月內無色慾者患處平妥無弩肉乃其徵也此法余精思所得百發百中切勿輕視之蔓麟謹識

追疔奪命湯　服之速効能內消腫

羌活　獨活　青皮　防風倍用　黄連

天花粉　赤芍　細辛　蟬脫　殭蚕

桔梗　金銀花　歸稍　川芎　白芷

連翹　山梔仁　甘草節

在脚加木瓜牛膝薏苡仁　一方加澤蘭一錢生

姜十片葱三莖煎熱服以衣被覆之出汗爲妙

外用飛丹白凡火上熬和碾末鷄子清調敷之

又方　用螻蛄蟲搗爛敷瘡上能拔疔根

當歸散

當歸　川芎　赤芍　荆芥

乾葛　烏藥　白芷　獨活　升麻
羌活　青皮　蟬脫　甘草　防風
枳殼　紅花　蘇木
瘡疼加乳香沒藥　瘡熱不退加淡竹茹山梔仁
腫不退加甘草節降眞香節
眼昏加川芎白芷荊芥防風蔓荊子
渴加天花粉乾葛麥冬
小便閉加滑石木通車前子
右水二鍾烏豆十粒煎服病在上食后服病在下
食前服

茺蔚散　治急慢疔瘡

本草云益母草味辛甘微寒無毒擣其莖葉以傅疔腫服其汁以使疔腫内消隨處有之多生背陰地四方莖根對節生葉嗅之畧臭節間生紅白花四五月採之陰乾

益母草一味燒存性爲末先以小鑠刀十字剖破疔瘡根至痛處令出血以繞疔根出血撚盡惡血拭乾以稻草心蘸益母草灰撚入瘡孔中遍傳到底良久當有紫黑血撚出令盡拭乾再撚入前藥見紅血則止一日夜三五度重者三日根爛出輕

者一日半出瘡根盤腸根出即瘡根起也針挑出
之雖挑不出其根自爛無憂矣內服救生奪命丹
如無則服忍冬酒日夜服之并服追疔奪命湯若
得此症便發寒熱半身麻木嘔吐不食其痛應心
者甚急三五日便死急用小刀劃斷疔根出血令
盡若有疔發于三四處只去先發爲要其餘即無
害矣如前治之若陽症形體壯者實者以鋒針刺
瘡四邊多出血以洩毒氣針刺所屬經絡而瀉之
暑濕忌風寒房事酒肉魚腥蒜椒辛辣油膩粘滑
生冷狐臭息香射香湯火氣

又方用蒼葺草野菊花二味搗汁和酒服之微醉患處以衣覆之睡一時痛定熱除矣
又方魚腥草搗汁和酒服之查付患上
疔瘡頭陷碧綠色者不可用針刀出血畧挑開麝付入益母灰又搗益母汁服之更妙
又有日久潰爛者不可用針出血只以鐮刀割去腐肉以益母草灰付之
護心散　疔瘡煩燥作渴惡毒攻心
青黛二兩　雄黄五錢　射香少許　蒼耳灰二錢
右爲細末每服二錢蜜水調下

一疔瘡生根入腹者便死用磨針刀鐵漿水一碗絲綿濾淨銀窩內煎三四沸服之病者須臾腸鳴行利一二次甦醒方可

一疔瘡不破則毒入腸胃惟蟬殼極効以一兩為末蜜調下

拔疔散　面粉　射香　人耳中膜各等分

右為末葱涎搜膏連紙貼患處其瘡根盡拔出

凡疔瘡發于頭面上者切不可用冷藥敷之若敷冷藥趕熱毒惡戾之氣入于喉間斷不能生矣

疔瘡有十三種

一曰麻子疔其狀肉起頭如黍米色稍黑四邊微赤多痒忌食麻子油及芝麻并着麻衣并入麻田中行走

二曰石疔其狀皮肉相連色如黑豆甚硬刺之不入肉微痛忌瓦礫磚石之屬

三曰雄疔其狀皰起頭黑靨四畔仰皰漿起有水出色黃大如錢孔形狀高厚

四曰雌疔其狀瘡稍黃向裏靨亦似灸瘡四面皰漿起心凹色赤如錢孔

五曰火疔其狀如湯火燒灼瘡頭黑靨四邊有烟漿

又如赤粟米者忌火燒烙
六曰爛疔其狀色稍黑有白斑瘡瘡中潰有膿水流
出瘡形大小如匙面者忌食熱物
七曰三十六疔其狀頭黑浮起形如黑豆四畔起赤
色今日生一明日生二及至十餘若滿三十六藥
不能治未滿可治
八曰蛇眼疔其狀瘡頭黑皮浮生形如小豆狀似蛇
眼大身體硬
九曰鹽膚疔其狀大如匙面四邊皆赤有黑粟粒起
大忌食鹽

十曰水洗疔其狀大如錢形如錢孔瘡頭白裏黑靨汁出中鞕忌飲漿水并水洗

十一曰刀鐮疔其狀濶狹如薤葉狀長一寸左側肉黑如燒烙忌刺及刀并鐵器

十二曰浮漚疔其狀瘡體員曲少許不長而狹如薤葉大內黃外黑其黑處刺之不痛黃處刺之痛

十三曰牛狗疔其狀肉色皰起掐不破已上十三種初起瘡心先痒後痛先寒後熱定則寒多四肢沉重心驚眼花嘔逆者難治惟麻子疔始末皆痒已上諸疔切不可觸犯若觸犯之必難治者凡孝服

鷄犬月經婦人狐臭之類悉屏之須要戒怒寛懐

爲上策謹慎謹愼


青芥

青疔者根在肝發起于目下如瘤瘢色青如石使
人目昏無見恐悸驚卧不寧或生筋骨之間久則
令人目盲或舌强語澁或脫精此症不出一年病
危最急治療之方一宗于後
方用紫花草敷瘡上

黄亣



黄疔者脾中受熱根于胃氣邪風發于唇齒齦之邊初生色黄有水四邊麻木然發中有黄故令人多食手足麻木涎出煩燥腹脹嗜睡不言者死未者可治形如魚脂


赤疔

一名紅絲血箭疔　一名紅演兒　一名紫疥斑
赤疔者根在心發起于舌下根所俱赤作痛舌硬
不能言語恍惚煩渴飲水不竭小便不通者死未
者可治七日可知禍至矣
內服救急丹　黃連解毒湯　連翹敗毒湯
馬蹄香搗碎加水取汁服之立愈

白疔

白疔者大腸虛熱根在肺起于右鼻初起如粟米火根赤頭白或麻木或疼痛使人增寒頭重鼻口乾咽喉燥不欲飲食如胸膈滿悶喘促昏睡者死未者可治不過七日禍必至矣

用紫花草敷瘡上



黑疔者膀胱虛熱根在腎發于耳前狀如瘢痕色

黑堅硬使人牙關緊急腰疼脚膝不仁不然頭疼

三日禍至矣　形似蕎麥皮　用紫花草敷瘡上

五疔者皆因喜怒憂思衝冒寒熱是以蓄其邪毒

浸漬其臟腑久而發爲疔瘡

芝麻疔

芝麻疔用黑雲膏 用紫花草敷瘡上 走注者

遍身疼不能轉動 服蠲毒流氣飲 蟾酥丸

氣疔用勝金錠　服蟾酥丸　外用紫花草敷之

氣疔

火疔

火疔用勝金錠　服蟾酥丸　紫花草敷瘡上



且冷疔者高粱之變風濕餘毒天陰久冷攻于脚下傳于足太陰經初生如米漸成潰爛其色如煤敗血來侵骨肉損壞遂成大患經年骨節疼痛累歲不能生肌先用艾葉蛇床子紫蘇豨薟草煎湯洗之內服黃芪白术蒼术當歸白芍連翹生地之藥外用隔紙膏貼之節勞內省亦可瘳矣

鐵粉散

黃丹一兩　生鐵粉二兩即針砂炒　射香五分　輕粉五分

松香五錢

右為末清油調貼瘡口上立愈



春用黑雲膏　夏用蟾舌膏

秋用梧淚膏　冬用勝金錠

五種疔瘡用蟾酥丸　能治諸般惡毒疔瘡其效不可盡述

珠砂　膽凡各五錢　血竭　銅青

蝸牛各一兩生用　雄黃　白凡各一兩　輕粉

沒藥　蟾酥各五錢　射香少許

右十一味除珠砂蟾酥蝸牛三味將八味爲末却將蝸牛蟾酥研極爛入前藥合均再入珠砂一半在內爲丸如鷄頭大又將珠砂一半爲衣每一丸

令病人先嚼葱白三寸吐在手心内裹藥熱酒一

盞吞下重者行五里有汗出輕者車行三里有汗

出立效服藥後用厚被蓋之以出邪汗

勝金錠

人言　雄黄　硇砂　輕粉　射香

共爲末用黄蠟溶化和藥成膏子水浸少時取出

用時捏餅子如錢眼大用羊骨針撥開瘡口放藥

在内用膏藥貼之仍用蟾酥丸

黑雲膏

蒼耳草連莖葉子俱用燒灰用臘月猪肝研爛成

膏用厚皮紙攤貼瘡上其根自出


蟾舌膏


用蝦蟆舌一箇研爛用紅絹片攤貼其根自出

蟾肚皮代絹妙

桐淚膏

梧桐淚丸如赤豆大用羊骨針撥破瘡頭放藥在內用乾麵圍四畔仍用太乙膏貼之又用紫花草付上






W138
1856
v.4

